

§ observ.
lues deux fois.

7.



Observation sur une plaie transversale
à la partie inférieure de la cuisse.

0

Quoique les préceptes de la chirurgie sur le
traitement des plaies soient établis d'une manière
qu'il ne reste aux gens de l'art qu'à en faire une
juste application dans les différents cas qui
peuvent se présenter, Il n'est cependant pas
hors de propos de rappeler des faits particuliers
capables de confirmer les règles les plus
judicieuses.

Un homme de soixante-dix ans Cordonnier
en coupant un morceau de cuir fort sur les
genoux avec un tranchet, Cet outil porta
fortement sur la cuisse droite environ trois
lignes au dessus de la rotule, y fit une plaie
qui pénétra jusqu'au fémur.

Le sang qui couloit avec une grande
abondance fut arrêté par plusieurs morceaux
de linge dont on tamponna la plaie, J'arrivai
quelque temps après, j'ottai cet appareil,

ARC 46 n° 2



Je lavai la plaie avec l'eau tiède pour la débarrasser des caillots de sang et ayant mis la jambe en extension, je jugeai que le bandage servirait un moyen suffisant pour maintenir les bords de cette plaie rapprochés et en procurer l'exakte réunion.

J'appliquai d'abord longitudinalement une pièce de linge longue de huit travers de doits et qui avait en largeur l'étendue de la plaie, je posai ensuite transversalement deux compresses minces sous la direction de la plaie l'une au dessus l'autre au dessous. Je les couvris avec quelques tours de bande serrés modérément, mais assez pour ne point laisser de vuide dans le fond de la plaie, je tirai ensuite vers le bas le chef supérieur de la compresse longitudinale et relevai son chef inférieur dans la vue de rapprocher encore les bords de la plaie, je continuai les tours de bande en dirigeant alternativement les circulaires de haut en bas,

en debas en haut et formons le bandage appelle
thiastre pour on se sert dans la fracture de la
rotule, je crus devoir arranger l'extrémité par
des fanons.

Le Malade fut saigné deux fois et mis
au bouillon; on fomenta la partie deux fois
le jour avec de l'eau et de l'eau de vie, l'appareil
fut levé le troisième jour, la plaie étoit en
très bon état, je refais le même bandage
qui fut levé pour la seconde fois trois jours
après. Il y avoit un peu d'inflammation aux
angles de la plaie; le malade fut saigné
deux fois mais légèrement, le huitième jour
l'inflammation se trouva diminuée par un
léger égorgeement suppuratoire que j'aidai
en ouvrant les plumaceaux de baume d'arcan
dissout dans le jaune d'œuf pendant cinq
ou six jours; par ce secours j'eus la satisfaction
de voir guérir le malade qui marcha le
dix huitième jour sans avoir la moindre
inconvénience; j'eus de l'effroi de le faire
plâtrer, comme il l'auroit pu, mais il y auroit



en à craindre la désunion des parties tendineuses
qui ne se consolident point aussi solidement
que les charnières.

2. Seconde observation

Sur une playe au dos par une chute
sur un débris de bouteilles de verre.

Un homme de cinquante quatre ans en
voulant descendre une pièce de bière dans sa
Cave tomba de la hauteur de quinze piés sur
un amas de bouteilles cassées, il se fit une
playe demi circulaire qui s'étendait de puis
l'angle inférieur de l'omoplate sur les côtes
et les vertèbres de l'étendue de dix huit pouces;
les apophyses épineuses et transverses étoient
découvertes; après avoir lavé cette playe avec
de l'eau tiède et fait les recherches nécessaires
pour la débarrasser des particules de verre et
autres corps étrangers, je replaçai le lambeau
dans la situation naturelle, je le couvris
d'une compresse quarrée peu épaisse qui

qui débordait les bords de la plaie de trois travers
de doigts, je garnis avec deux compresses longuettes
de l'épaisseur d'un demi doigt d'enfoncement qui
se trouve à chaque côté des apophyses épineuses
des vertèbres. Cet appareil fut soutenu par une
autre compresse que je continuai en faisant le
bandage appelle l'étoile double pour chaque
croise étoit assujéti; j'y ajoutai encore le bandage
de corps avec le scapulaire; je saignai le
malade qui qu'il eut beaucoup perdu de sang
et ne prit que du bouillon fort léger de quatre
en quatre heures et de la ptisanne de fennel
pour boisson ordinaire.

Malgré les précautions que j'avois prises
je me vis obligé de lever l'appareil par que
le malade s'étoit beaucoup tourmenté; je
trouvai en effet que le tambour s'étoit relevé,
pour prévenir parait inconvenient je fis plusieurs
points de suture entrecoupés et je fis le même
bandage que ci-dessus, trois jours après
en pansant le malade je trouvai plus de la
moitié du tambour réuni sans la moindre



apparue d'inflammation; Deux jours après
j'aperçus de la supuration du côté de l'angle
inférieur, Il y avoit de l'inflammation autour
des points de suture; J'en coupai les fils,
pensai le malade en serrant un peu moins
le bandage; l'abondance du pus qui se forma
dans cette playe m'obligea de la panser deux
fois le jour; Je faisois des injections emollientes
et vulnéraïres, au bout de huit jours la circonférence
de la playe se trouva réunie à l'exception d'environ
un pouce à la partie supérieure et à l'inférieure.
Je faisois par une de ces ouvertures l'injection
qui ressortoit par l'autre, la supuration alloit
toujours en diminuant, la playe supérieure
se cicatrisa la première et comme j'en aperçus
dans les excréations de la playe qu'il y avoit
quelques portions tendineuses, j'y injectai ensuite
de la teinture d'alois et de l'huile de thérbentine
à parties égales. J'introduisois dans l'ouverture
inférieure une meche de charpie trempée dans

Dans l'eau vulnéraire et le miel rosat, au bout de
quinze jours le pus devint très louable, la merche
fut supprimée, je n'appliquai plus qu'une compo-
sée trempée dans le vin chaud et la plaie fut
guérie par faitement en cinq semaines.

Croisième observation.

Sur une plaie par un coup de serpe à la
partie supérieure du coronal.

Une fille de vingt à vingt deux ans réunie
au front un coup de serpe qui lui fit une plaie
avec lambeau; Il s'étendait depuis la partie
supérieure du coronal jusqu'à l'orbite du côté
droit et alla jusqu'au milieu de l'orbite de
l'autre côté; on tenta la réunion par le bandage
unissant. On soigna la malade deux fois
des bras et deux fois du pied. Les saignées parvinrent
à répondre aux soins qu'on avoit pris jusqu'au
cinquième jour que le lambeau devint plat
quoique bien réuni dans toute la circonférence,
le sixième jour la fluctuation fut manifestée.



~~par~~ Monsieur de haussy maître en chirurgie
à Noyon fit une incision d'un pouce et demi
d'étendue au milieu de la base du lambeau,
Il pénétra par cette opération dans le centre
d'une collection de pus dont l'évacuation faite
la plaie fut parfaitement cicatrisée en
vingt jours. . . .

M^r Baillet







